



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

067. PROVA OBJETIVA

DENTISTA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** a **03**.



(Bill Watterson. *O mundo é mágico: as aventuras de Calvin e Haroldo*, 2010)

- 01.** A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que
- (A) a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça a sua segurança e a querer descartá-la.
 - (B) a reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta.
 - (C) o pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos.
 - (D) o pai segue segurando a bicicleta do filho apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta.
 - (E) o filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, que isso o faz sentir medo de morrer.
- 02.** No contexto em que foram empregados, os vocábulos “iminência” e “desmantelar” possuem como sinônimos, respectivamente:
- (A) proximidade e desmanchar.
 - (B) dúvida e desmontar.
 - (C) véspera e abalar.
 - (D) superioridade e desfazer.
 - (E) aniquilação e abolir.
- 03.** Assinale a alternativa em que a frase da tira foi alterada em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.
- (A) O seu equilíbrio vai melhorar se você soltar-se.
 - (B) Me deixa tenso a iminência da morte, eu admito!
 - (C) Eu admito que deixa-me tenso a iminência da morte!
 - (D) Se concentre no seu objetivo.
 - (E) Pois eu não o vou mudar.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 09.

Flor-de-maio

Entre tantas notícias do jornal – o crime de Sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão – há uma pequenina nota de três linhas, que nem todos os jornais publicaram. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e diz que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada “flor-de-maio” está, efetivamente, em flor.

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar.

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam.

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa: no dia 27 em diante as “flores-de-maio” do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a “flor-de-maio”.

Ir só, no fim da tarde, ver a “flor-de-maio”; aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido; que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.

(Rubem Braga. *Para gostar de ler*. São Paulo: Ática, 1992, Adaptado)

04. A partir da leitura da crônica, é correto afirmar que a notícia sobre o desabrochar da flor-de-maio

- (A) surpreendeu o autor que, por não se interessar por plantas, procura passar adiante os detalhes a quem se interesse pelo assunto.
- (B) não foi considerada pelos jornais como algo importante e, portanto, não foi publicada em nenhum meio de comunicação no dia certo.
- (C) fez o autor se dirigir imediatamente ao Jardim Botânico para cumprimentar o responsável por este acontecimento.
- (D) foi, segundo o autor, o único fato importante daquele dia, embora os jornais tenham se concentrado em assuntos mais banais.
- (E) motivou o desejo do autor de ir ao Jardim Botânico para testemunhar algo de belo e emocionante que aconteceu na cidade.

05. A respeito das reflexões feitas pelo autor no texto, é correto afirmar que ele

- (A) considera que vale a pena escrever crônicas se elas servirem para inspirar as pessoas a priorizarem, em seu cotidiano, um acontecimento belo como o florescimento de uma flor-de-maio.
- (B) vê os leitores como pessoas superiores por não terem tantos compromissos diários que tomam tempo, como textos para ler e escrever e telefonemas para fazer.
- (C) se mostra sarcástico ao afirmar que a humanidade poderá ser salva se todos os jornais passarem a noticiar os nascimentos das flores em vez de dar notícias ruins.
- (D) julga que a queda de um andaime e o aumento do preço do pão fazem as pessoas se recolherem em suas casas, enquanto a notícia sobre o nascimento de uma flor as leva a saírem.
- (E) se mostra orgulhoso por ser o único a notar o nascimento da flor-de-maio e contar o fato para os leitores, ainda que ele não tenha condições de visitar o Jardim Botânico.

06. O trecho – No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém... (4º parágrafo) – pode ser assim reescrito, em conformidade com a norma-padrão de regência e emprego dos pronomes relativos:

- (A) No fundo, espero secretamente de que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (B) No fundo, tenho secretamente o desejo cujas estas linhas sejam lidas por alguém...
- (C) No fundo, secretamente anseio por que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (D) No fundo, tenho secretamente esperanças onde estas linhas sejam lidas por alguém...
- (E) No fundo, secretamente almejo de que estas linhas sejam lidas por alguém...

07. Em – Se entre vós houver essa criatura, e ela souber **por** mim a notícia... (5º parágrafo) –, o vocábulo foi empregado com o mesmo sentido que possui na frase:

- (A) Ele ficou admirando as flores do Jardim Botânico **por** muito tempo.
- (B) O diretor foi premiado **por** seu trabalho na administração do parque.
- (C) Ficou emocionado **por** ver a flor-de-maio com suas pétalas cor-de-rosa.
- (D) É importante que as pessoas se informem **por** algum jornal da cidade.
- (E) Soube que ela fora visitar o Jardim Botânico e ficou feliz **por** ela.

08. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita em conformidade com a norma-padrão de pontuação.

- (A) É assinada, pelo senhor diretor, do Jardim Botânico... (1º parágrafo)
- (B) ... e diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o Jardim... (1º parágrafo)
- (C) Mas havia, ainda muita coisa, para ler e escrever... (2º parágrafo)
- (D) ... desconfio que, esse impulso que tive ao ler a notícia, ficará no que foi... (3º parágrafo)
- (E) ... às vezes, ainda vale a pena, escrever uma crônica. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos a seguir.

- **Mas** havia ainda muita coisa para ler e escrever... (2º parágrafo)
- Se entre vós houver essa criatura, ... **então** eu vos direi que nem tudo está perdido... (5º parágrafo)

Os vocábulos em destaque expressam, respectivamente, os sentidos de

- (A) alternativa e oposição.
- (B) conclusão e alternativa.
- (C) tempo e condição.
- (D) oposição e conclusão.
- (E) condição e tempo.

10. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra “flor-de-maio”.

- (A) beija-flor
- (B) estrela-do-mar
- (C) segunda-feira
- (D) cirurgião-dentista
- (E) bem-me-quer

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

OIT: desigualdades de gênero no emprego são maiores do que se pensava

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. O documento “Novos dados esclarecem as diferenças de gênero no mercado de trabalho”, indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens.

A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres.

A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Essas atividades se tornam um impedimento não apenas para uma contratação, mas também para procurar emprego ativamente ou para estarem disponíveis para trabalhos de última hora.

(ONU News. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/03/1810927>. Adaptado)

11. A partir dos dados publicados no relatório da OIT, é possível concluir que

- (A) o acesso ao emprego foi dificultado para as mulheres nos últimos anos em comparação a períodos anteriores.
- (B) 24,9% das pessoas desempregadas nos países em desenvolvimento, atualmente, são mulheres.
- (C) os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego são maiores nos países desenvolvidos.
- (D) 15% das mulheres que não conseguem emprego nos países em desenvolvimento estão em idade produtiva.
- (E) o novo indicador considera como desempregadas um número maior de pessoas quando comparado a outros indicadores.

12. Há palavra empregada em sentido figurado na seguinte alternativa:

- (A) Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego... (1º parágrafo).
- (B) Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. (1º parágrafo).
- (C) Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho... (1º parágrafo).
- (D) ... 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar... (1º parágrafo).
- (E) ... as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. (3º parágrafo).

13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome na forma entre parênteses.

- (A) Capta todas **as pessoas** (capta-lhes).
- (B) Ele reflete **um quadro** (ele reflete-lo).
- (C) Novos dados esclarecem **as diferenças** (esclarecem-nas).
- (D) Incapazes de encontrar **uma vaga** (encontrar-na).
- (E) Afetam desproporcionalmente **as mulheres** (afetam-as).

14. Foi reescrito em conformidade com a norma-padrão de concordância o trecho:

- (A) Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor.
- (B) É captado, com o novo indicador da OIT, todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego.
- (C) Embora seja considerado alto, a taxa de desemprego entre os homens, de 16,6%, ainda é menor do que a das mulheres.
- (D) As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres.
- (E) Podem haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres.

15. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa:

- (A) A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante **à** das mulheres.
- (B) As mulheres estão aptas **à** competir por qualquer vaga de emprego, contanto que a sociedade lhes dê oportunidades.
- (C) O direito ao trabalho é inerente **à** toda mulher, embora em muitos lugares a equidade de gênero ainda seja um desafio.
- (D) O trabalho **à** que as mulheres aspiram deve levar em consideração também seus direitos reprodutivos.
- (E) Muitas pessoas dedicam-se **à** pesquisas sobre o impacto do desequilíbrio de gênero na economia dos países.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu que a saúde não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de contribuição ou pagamento de qualquer espécie, ao contrário, afirma que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à atenção à saúde.

Assinale a alternativa que expressa o princípio do SUS correspondente a essa afirmativa.

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Integralidade.
- (E) Regionalização.

17. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 1988.

- (A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.
- (B) Garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação.
- (C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- (D) Participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico.
- (E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

18. Os profissionais que atuam na Atenção Básica possuem atribuições comuns e outras funções que são específicas para cada categoria profissional.

Assinale a alternativa que indica uma atribuição comum para toda a equipe.

- (A) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) Informar aos usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
- (C) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades.
- (D) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
- (E) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita no âmbito da UBS e nos domicílios, e demais espaços comunitários quando necessário.

19. Um estudo analisou a ocorrência de óbitos por Doença de Chagas no Brasil, na série histórica de 2007 a 2014. Foram registrados 37 817 óbitos por Doença de Chagas, com taxa de letalidade maior entre os homens. A taxa de letalidade por Doença de Chagas corresponde

- (A) à razão entre o número absoluto de casos novos de Doença de Chagas e a população estimada para o ano correspondente, multiplicando-se por 100 mil.
- (B) à proporção de notificações e de casos confirmados de Doença de Chagas ocorridos no ano considerado em relação ao ano anterior, por mês de início de sintomas.
- (C) ao número de casos notificados, investigados e confirmados de Doença de Chagas em determinada população e ano.
- (D) à razão entre o total de óbitos por Doenças de Chagas e o total de casos de Doença de Chagas no ano considerado.
- (E) ao registro de casos e óbitos por Doença de Chagas na população residente por ano considerado.

20. Em um estudo epidemiológico realizado com uma população definida, coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo e, a partir desse conjunto, quatro grupos são constituídos para análise: expostos que apresentam a doença; expostos que não apresentam a doença; não expostos que apresentam a doença; e não expostos que não apresentam a doença.

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

- (A) Coorte.
- (B) Caso Controle.
- (C) Transversal.
- (D) Ecológico.
- (E) Ensaio Comunitário.

21. O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval causou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram muitas vítimas e um rastro de destruição nas cidades da região, principalmente na costa Sul do município de São Sebastião. Foram mais de 50 mortes, muitos desabrigados e desalojados e uma série de danos à saúde decorrentes da tragédia.

Assinale a alternativa que contém uma ação de responsabilidade da Vigilância em Saúde a ser realizada no atendimento às situações de emergência em saúde pública, como a ocorrida no Litoral Norte.

- (A) Atuar junto ao Corpo de Bombeiros nas ações de busca, resgate e salvamento das vítimas nas áreas soterradas.
- (B) Identificar e monitorar os potenciais fatores de risco que possam comprometer a potabilidade da água para consumo humano.
- (C) Realizar cadastramento e triagem da população afetada pelo desastre.
- (D) Estruturar os locais de implantação de abrigos temporários, que estarão diretamente relacionados à intensidade do evento.
- (E) Coordenar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, água potável, produtos de higiene pessoal, entre outros, que serão triados e distribuídos para a população afetada.

22. Mais de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva foram resgatados de um alojamento em uma cidade na Serra Gaúcha, onde eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão.

Assinale a alternativa que especifica uma ação de responsabilidade do setor saúde.

- (A) Acomodar os trabalhadores em alojamento temporário e realizar o pagamento de direitos por meio de processo judicial ou de acordo trabalhista.
- (B) Adotar medidas visando o regresso dos trabalhadores à sua cidade de origem.
- (C) Auxiliar o Auditor Fiscal do Trabalho na emissão de guias do Seguro Desemprego para os trabalhadores resgatados.
- (D) Notificar os casos de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), na Ficha de Notificação de Violência.
- (E) Promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos dos trabalhadores submetidos ao trabalho degradante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 23.** Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor de saúde. Os óbitos de crianças menores de um ano são monitorados por meio do indicador denominado
- (A) taxa de mortalidade neonatal.
 - (B) mortalidade proporcional em menores de um ano.
 - (C) coeficiente de mortalidade perinatal.
 - (D) mortalidade específica pós-natal.
 - (E) taxa de mortalidade infantil.
- 24.** Ações educativas relacionadas aos comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, ingestão de drogas ou de tabaco, são exemplos de medidas de saúde que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam aos agentes agressores.
- Segundo Leavell & Clark, essas medidas fazem parte do nível de Prevenção
- (A) Primária.
 - (B) Quartenária.
 - (C) Secundária.
 - (D) Terciária.
 - (E) Primordial.
- 25.** Para organizar e garantir resolutividade das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é necessário estabelecer e manter os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade, tendo como fundamentos, dentre outros, a disponibilidade de recursos e a integração horizontal e vertical.
- Assinale a alternativa que contém uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS.
- (A) Serviços ambulatoriais especializados.
 - (B) Centros de Atenção Psicossocial.
 - (C) Serviços de Atenção Hospitalar.
 - (D) Vigilância em Saúde.
 - (E) Unidade de Tratamento Intensivo.
- 26.** A aplicação dentária de produtos com alta concentração de fluoreto objetiva principalmente a
- (A) manutenção do meio subsaturado em relação ao mineral dental.
 - (B) formação de novos cristais puros de fluoreto de potássio no dente.
 - (C) diminuição do pH na superfície do esmalte e da dentina.
 - (D) formação de reservatórios lábeis de fluoreto de cálcio.
 - (E) formação de dois produtos de reação, o fluoreto de amina e o carbonato de cálcio.
- 27.** Diferentes critérios têm sido utilizados para a detecção da cárie dentária em estudos clínicos e epidemiológicos. Em relação ao índice CPO preconizado pela OMS, é correto afirmar que
- (A) não detecta lesões não cavitadas.
 - (B) determina a atividade de lesões de cárie.
 - (C) utiliza o exame clínico e radiográfico.
 - (D) classifica as lesões de cárie em sete estágios, variando de 0 (hígido) a 7 (ampla cavidade em dentina).
 - (E) classifica as lesões cariosas levando em consideração a sua severidade.
- 28.** Paciente de 52 anos, sexo masculino, saudável, apresenta, durante procedimento odontológico, desfalecimento sem perda de consciência, com integral conservação das funções respiratórias e cardíacas, caracterizado por palidez, suor frio, vertigens e sensação de desmaio. Uma hipótese de diagnóstico e respectiva conduta para essa emergência médica são:
- (A) síncope; posicionar o paciente em posição supina ou pressionar a sua cabeça em direção as pernas na posição sentado.
 - (B) lipotímia; posicionar o paciente em posição supina ou pressionar a sua cabeça em direção as pernas na posição sentado.
 - (C) convulsão; posicionar o paciente em posição supina com a cabeça lateralizada.
 - (D) ataque isquêmico transitório; administrar antiplaquetário.
 - (E) infarto agudo do miocárdio; administrar oxigênio por máscara ou cânula nasal.

29. A epinefrina é o vasoconstritor mais eficaz e seguro para uso odontológico, mas possui limitações e contraindicações. Recomenda-se que as soluções anestésicas locais com epinefrina (ou qualquer outro vasoconstritor adrenergico) não sejam empregadas em pacientes que
- (A) foram diagnosticados com transtorno de espectro autista.
 - (B) sofreram acidente vascular encefálico há menos de 15 meses.
 - (C) estejam no segundo trimestre da gestação.
 - (D) foram diagnosticados com anemia ferropriva.
 - (E) fazem uso contínuo de derivados das anfetaminas.
30. Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) são indicados para o controle da dor aguda, de intensidade moderada a severa, no período pós-operatório de intervenções odontológicas eletivas. Assinale a alternativa correta em relação aos AINEs.
- (A) Os anti-inflamatórios ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco e piroxicam são inibidores seletivos para a COX-2.
 - (B) O regime mais eficaz com os AINEs é o de analgesia preemptiva, introduzido imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa.
 - (C) Os AINEs podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.
 - (D) O mecanismo de ação dos AINEs inclui a indução da síntese de lipocortinas, um grupo de proteínas responsáveis pela inibição da fosfolipase A2.
 - (E) O uso concomitante de ibuprofeno com a varfarina pode aumentar o risco de trombose, especialmente em idosos.
31. A dentição decídua tem características únicas que a diferem em diversos aspectos da dentição permanente. Assinale a alternativa correta em relação às características da dentição decídua.
- (A) A arcada dentária tipo I, de acordo com Baume, é aquela que não apresenta diastemas entre os dentes anteriores e pode apresentar tendência maior a apinhamento na região anterior, quando da substituição dos decíduos pelos permanentes.
 - (B) O espaço primata se localiza entre o incisivo lateral e o canino, na mandíbula, e entre o canino e o primeiro molar decíduo, na maxila.
 - (C) Os dentes decíduos estão implantados obliquamente na base óssea; essa situação faz com que a arcada dentária decídua apresente acentuada curva de *Spee*.
 - (D) Ao se examinar as arcadas decíduas em relação à sua base óssea, em vista anteroposterior, os superiores apresentam o longo eixo com convergência para lingual, consideradas de apical para oclusal, e os inferiores apresentam divergência de apical para oclusal.
 - (E) A articulação temporomandibular localiza-se próxima ao plano oclusal dos dentes inferiores e paralela a ele, sendo que, conforme a criança cresce, a articulação se estabelece em um plano mais alto em virtude do crescimento facial.
32. Paciente de 4 anos, sexo masculino, sofreu queda de bicicleta e consequente luxação intrusiva parcial do dente 51, sem fratura da tábua óssea e sem lesão ao dente permanente. A conduta clínica odontológica inicial mais indicada é a
- (A) remoção cirúrgica do dente instruído e instalação de um aparelho mantenedor de espaço.
 - (B) redução cirúrgica para a posição normal, imobilização e biopulpectomia.
 - (C) redução cirúrgica para a posição normal, imobilização e necropulpectomia.
 - (D) acompanhamento clínico e radiográfico durante a espera por uma erupção passiva.
 - (E) remoção cirúrgica do dente instruído sem a necessidade de instalação de um aparelho mantenedor de espaço.
33. De acordo com classificações das lesões e cavidades, as lesões e/ou cavidades preparadas no terço médio e cervical das faces livres de todos os dentes e que envolvem também os terços proximais são classe
- (A) I típica.
 - (B) I atípica.
 - (C) II.
 - (D) III típica.
 - (E) V atípica.

34. Em relação à técnica incremental para inserção de resina composta fotopolimerizável em cavidades preparadas, é correto afirmar que
- (A) visa promover a diminuição do fator de configuração cavitária (fator C) em função de a união de cada incremento restringir-se a poucas paredes.
 - (B) preconiza a colocação de pequenos incrementos de resina composta, de aproximadamente 8 mm, polimerizados individualmente.
 - (C) preconiza que cada incremento de resina inserido deva ficar em contato com, no máximo, três paredes da cavidade.
 - (D) promove menos áreas de superfícies livres para escoamento e alívio das tensões.
 - (E) preconiza a inserção da resina pela caixa oclusal em restaurações classe II.
35. Paciente de 61 anos, sexo feminino, saudável, apresenta restauração profunda em RCF (MVP) no dente 13. Os testes de sensibilidade pulpar apresentam resultado negativo. O paciente relata dor diante da percussão vertical e sensibilidade à palpação na região da mucosa vestibular relacionada ao dente em questão. No exame radiográfico se observa o espessamento do ligamento periodontal. O tratamento indicado para o caso clínico descrito é:
- (A) capeamento pulpar indireto.
 - (B) necropulpectomia II.
 - (C) biopulpectomia.
 - (D) pulpotomia parcial.
 - (E) pulpotomia total.
36. Paciente de 8 anos, sexo masculino, sofreu fratura coronariana com envolvimento pulpar no dente 11, durante jogo de basquete. Recebeu atendimento odontológico 48 horas após o trauma. No exame clínico, observa-se pequena exposição de polpa vital. O exame radiográfico mostra o ápice radicular aberto. A conduta clínica mais indicada para esse caso clínico é:
- (A) capeamento pulpar direto.
 - (B) capeamento pulpar indireto.
 - (C) biopulpectomia.
 - (D) pulpotomia.
 - (E) necropulpectomia.
37. O MTAD (4 metil-1,24 triazoline-3,5-dione) é uma solução irrigadora que oferece uma efetiva propriedade antibacteriana, sendo pouco citotóxica, indicada para a irrigação final, após a instrumentação do canal radicular. É constituída por uma mistura de
- (A) EDTA, clorexidina e cetramida.
 - (B) Hipoclorito de sódio e cetramida.
 - (C) Doxiciclina, ácido cítrico e detergente (Tween 80).
 - (D) Brometo dicetiltrimetilamonio, hidróxido de sódio e água destilada.
 - (E) Peroxido de ureia, detergente (Tween 80) e Carbowax (polietilenoglicol).
38. O tipo de margem cervical a ser selecionado para o preparo dental depende das necessidades estéticas, do tipo de material de que será feita a prótese e da extensão apical do preparo. Em ordem decrescente de desgaste dental da margem cervical, assinale a alternativa correta.
- (A) Lâmina de faca > Chanfro > Chanfro profundo > Ombro com bisel > Ombro.
 - (B) Ombro com bisel > Ombro > Lâmina de faca > Chanfro profundo > Chanfro.
 - (C) Lâmina de faca > Ombro > Ombro com bisel > Chanfro > Chanfro profundo.
 - (D) Ombro com bisel > Ombro > Chanfro profundo > Chanfro > Lâmina de faca.
 - (E) Chanfro profundo > Chanfro > Ombro com bisel > Ombro > Lâmina de faca.
39. Assinale a alternativa que apresenta material de moldagem anelástico com mecanismo de presa por alteração de temperatura.
- (A) Polissulfeto.
 - (B) Hidrocoloide irreversível.
 - (C) Godiva.
 - (D) Pasta zincoeugenólica.
 - (E) Siliconas.

40. O cimento de dentes tanto irrompidos como não-irrompidos está sujeito a reabsorção. A reabsorção não é necessariamente contínua e pode alternar-se com períodos de reparação e depósito de novo cimento. O cimento recém-formado é demarcado na raiz por uma linha irregular fortemente corada, denominada
- (A) linha de Burton.
 - (B) linha reversa.
 - (C) linha de Retzius.
 - (D) linha incremental de Von Ebner.
 - (E) Banda de Hunter.
41. Técnica cirúrgica que pode ser usada isoladamente para proporcionar o aumento da zona de gengiva inserida.
- (A) Retalho deslocado apicalmente.
 - (B) Retalho de Widman modificado.
 - (C) Retalho de Widman.
 - (D) Gengivectomia.
 - (E) Retalho não-deslocado.
42. O primeiro passo clínico na remoção de um dente pela técnica de extração fechada é:
- (A) expansão óssea por meio da pressão apical do fórceps no dente.
 - (B) expansão óssea por meio da pressão vestibular do fórceps no dente.
 - (C) afrouxamento do tecido mole de adesão da porção cervical do dente.
 - (D) tracionamento do dente com o uso do fórceps.
 - (E) luxação do dente por meio de alavancas.
43. Se os dentes nos quadrantes maxilares e mandibulares do lado direito precisam ser extraídos em uma única consulta, a seguinte ordem sequencial é recomendada:
- (A) dentes mandibulares posteriores; dentes mandibulares anteriores, deixando o canino; caninos mandibulares, dentes maxilares posteriores; dentes maxilares anteriores, deixando o canino; caninos maxilares.
 - (B) dentes mandibulares posteriores; dentes maxilares posteriores; dentes mandibulares anteriores, deixando o canino; caninos mandibulares; dentes maxilares anteriores, deixando o canino; caninos maxilares.
 - (C) dentes maxilares posteriores; dentes mandibulares posteriores; dentes mandibulares anteriores, deixando o canino; caninos mandibulares; dentes maxilares anteriores, deixando o canino; caninos maxilares.
 - (D) dentes mandibulares anteriores, deixando o canino; caninos mandibulares; dentes maxilares anteriores, deixando o canino; caninos maxilares; dentes mandibulares posteriores; dentes maxilares posteriores.
 - (E) dentes maxilares posteriores; dentes maxilares anteriores, deixando o canino; caninos maxilares; dentes mandibulares posteriores; dentes mandibulares anteriores, deixando o canino; caninos mandibulares.
44. Em relação ao tratamento da actinomicose nos tecidos moles e duros da cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.
- (A) O antibiótico de primeira escolha para o tratamento da actinomicose é o metronidazol.
 - (B) A terapia da actinomicose inclui incisão e drenagem cirúrgica e excisão de todas as fístulas.
 - (C) O controle inicial da infecção inclui a administração de curta dose de antibióticos.
 - (D) O fármaco de segunda escolha inclui a penicilina, que pode ser administrada oralmente, em dose única diária.
 - (E) Os dois medicamentos mais comumente usados para o tratamento da actinomicose são a nistatina e o clotrimazol.
45. Método radiográfico que tem o objetivo de facilitar a visualização das raízes dos molares superiores, anteriormente sobrepostas pelo processo zigomático da maxila. Constitui na colocação de um rolete de algodão, fixado ao filme radiográfico, melhorando as condições de paralelismo entre o longo eixo do filme radiográfico e o dente a ser radiografado.
- A descrição refere-se ao método de
- (A) Parma.
 - (B) Miller-Winter.
 - (C) Clark.
 - (D) Le Master.
 - (E) Miller-Winter (modificação de Donovan).

46. Os dentes decíduos têm como função manter o espaço tanto mesiodistal quanto cérvico-oclusal para o correto posicionamento dos dentes permanentes. Quando perdidos precocemente, pode ocorrer a migração dos dentes adjacentes para a região da perda, levando ao fechamento ou redução do espaço destinado à irrupção do dente permanente sucessor. Um aparelho para manter o espaço é o arco lingual, cuja principal indicação é manter o espaço
- (A) nos casos de perdas precoces bilaterais de um ou mais molares decíduos e preferencialmente com os primeiros molares permanentes erupcionados.
 - (B) na transição da dentição decídua para a dentição mista no intuito de eliminar o espaço livre de Nance e evitar o apinhamento dos incisivos inferiores.
 - (C) nos casos de perdas precoces unilaterais de um ou mais molares decíduos e preferencialmente antes das erupções dos primeiros molares permanentes.
 - (D) quando os incisivos inferiores permanentes ainda não estiverem erupcionados.
 - (E) em casos de discrepâncias negativas, maiores de 2 mm na transição da dentição mista para permanente.
47. Paciente de 4 anos, sexo feminino, portadora de infecção pelo HIV, apresenta faixa avermelhada e edemaciada, na gengiva marginal, a 2 mm de distância da gengiva livre, estendendo-se até a mucosa alveolar. Uma hipótese de diagnóstico plausível é:
- (A) leucoedema.
 - (B) leucoplasia.
 - (C) candidíase crônica hiperplásica.
 - (D) eritema gengival linear.
 - (E) lesão central de células gigantes.
48. Paciente de 48 anos, sexo feminino, apresenta lesão radiolúcida periapical bem definida na região do dente 24. Sabendo tratar-se de um tumor odontogênico benigno de origem mesenquimal, uma hipótese de diagnóstico plausível é:
- (A) ameloblastoma sólido multicístico.
 - (B) fibroma odontogênico central.
 - (C) tumor odontogênico epitelial calcificante.
 - (D) tumor odontogênico cístico calcificante.
 - (E) fibro-odontoma ameloblástico.
49. Administrada em dose única, via subcutânea. Recomenda-se uma 2ª dose para atingir melhores índices de proteção com intervalo de 30 dias.
- A descrição refere-se à vacina contra
- (A) hepatite A.
 - (B) tétano e difteria (dT adulto ou toxóide tetânico).
 - (C) tuberculose (BCG).
 - (D) hepatite B.
 - (E) rubéola, sarampo e caxumba (MMR tríplice viral).
50. Recomenda-se a inclusão do Gerente de Atenção Básica com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, em especial ao fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à população adscrita, por meio de função técnico-gerencial. Dentre suas atribuições estão:
- (A) implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados à sua área de competência na UBS.
 - (B) encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
 - (C) mitigar a cultura segundo a qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidades pela sua própria segurança e pela de seus colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança.
 - (D) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
 - (E) participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.

