

# CONCURSO PÚBLICO 15/10 TARDE SURUBIM (PE)



## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

100 QUESTÕES OBJETIVAS

**igeduc**

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

**CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS**

---

**Leia atentamente as informações abaixo:**

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
  - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
  - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
  - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
  - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em [concursos.igeduc.org.br](http://concursos.igeduc.org.br).
- 

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
(de 1 a 70)**

**Julgue os itens a seguir.**

01. A máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções por inalação de aerossóis transmitidos a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Serve também para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio trabalhador ou pelo paciente.
02. A nutrição parenteral é recomendada quando a nutrição enteral não permitir a ingesta suficiente para atender a todas as necessidades nutricionais do paciente ou quando o paciente tem um trato gastrointestinal não funcional, inacessível ou perfurado.
03. Os tubos de vidro ou plástico contendo gel separador podem causar interferência nos testes de coagulação. Tubos sem aditivos devem ser usados antes dos tubos destinados aos testes de coagulação.
04. A insulina regular é uma insulina de ação prolongada utilizada para cobrir ou corrigir oscilações da glicose do período pós-prandial e também hiperglicemias aleatórias.
05. É vedada a participação direta ou indireta de empresas, ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
06. Em crianças apresentando choque hipovolêmico, deve ser utilizada solução cristalóide isotônica (Ringer com lactato ou solução salina isotônica) no início do tratamento: infusão em bólus de 20 mL/kg de solução, mesmo se a pressão arterial estiver normal.
07. O valor de referência da glicemia depende da presença ou não de jejum. O diagnóstico de diabetes mellitus é feito quando duas ou mais dosagens de glicemia de jejum, após jejum mínimo de 8 h, são iguais ou maiores do que 126 mg/dL.
08. O processo de formação neoplásica denominado metaplasia é dinâmico e contempla as etapas de iniciação, promoção, progressão e manifestação.
09. A absorção é a passagem do fármaco do local onde foi administrado para a corrente sanguínea. Essa etapa não acontece quando o medicamento é diretamente administrado na circulação, como, por exemplo, na via endovenosa.
10. A visita domiciliar é um componente da atenção domiciliar, que é um instrumento extremamente útil para que a estratégia da saúde da família identifique as necessidades em saúde, as vulnerabilidades presentes no território e nas famílias, e possibilite a atenção continuada. Todas as idas ao domicílio, e todos os encontros realizados na residência do paciente são considerados visita domiciliar.
11. A ambulância de Suporte Básico de Vida é destinada ao atendimento e ao transporte de pacientes em emergências que requeiram assistência médica e de enfermagem de maior complexidade, além de realizar transporte inter-hospitalar de pacientes enfermos e resgate.
12. O organograma é o gráfico que apresenta a organização formal de um serviço de saúde, sua estrutura, seus órgãos competentes, as vias hierárquicas, a subordinação e interdependência das partes que constituem a organização. Portanto, é a representação gráfica de uma estrutura administrativa, indicando a hierarquia funcional e as linhas de subordinação.
13. O Procedimento Operacional Padrão, conhecido como POP, é um documento formatado como manual descritivo para a execução de tarefas e procedimentos. Serve para informar aos profissionais envolvidos nos processos sobre as diretrizes de atuação, mantendo assim a padronização das atividades.
14. Quando sintomas depressivos e ansiosos estão presentes, mas nenhuma das duas síndromes chega a constituir um diagnóstico, denomina-se o quadro de síndrome mista de ansiedade e depressão.
15. A vacina tríplice viral é contraindicada para crianças expostas ao HIV. A vacinação dessas crianças deve ser feita com a vacina tetraviral (atenuada).

16. A prevenção primária ao câncer consiste em um conjunto de ações que objetivam reduzir o risco ao câncer por meio da eliminação ou limite da exposição aos fatores casuais e promoção dos fatores de proteção, incluindo atividades de promoção à saúde.
17. Todos os materiais críticos termossensíveis devem ser esterilizados por vapor saturado sob pressão.
18. Durante a higiene da pessoa idosa, deve-se estar atento à ocorrência de hiperemia ou descamação na região perineal, que pode indicar a presença de dermatites ou úlceras por pressão.
19. Pacientes com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) como resultado de trauma contuso não devem ser mantidos com imobilização da coluna vertebral, devido à possibilidade de agravamento da lesão.
20. Não está contraindicada a realização do exame citopatológico em mulheres grávidas, porém, a coleta deve ser feita com a espátula de Ayres e não usar escova de coleta endocervical.
21. A internação em leitos de Saúde Mental só é indicada quando o usuário apresentar comorbidades psíquicas ou fisiológicas que o coloquem em risco imediato e quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
22. A câmara da autoclave deve ser preenchida, no máximo, até 80% de sua capacidade total, sem que os materiais encostem nas paredes, a fim de permitir a remoção do ar de dentro dos pacotes, caixas cirúrgicas e câmara interna, propiciando a circulação do vapor.
23. A exérese é a cirurgia propriamente dita. Nessa etapa, os tecidos já estão separados, a cavidade aberta, o funcionamento do órgão deverá ser alterado e o órgão deve ser extirpado. Representa o tempo mais elaborado da intervenção e exige maiores cuidados da equipe cirúrgica.
24. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional de enfermagem terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.
25. Em idosos, o esquema vacinal da Pneumo 23v é de 1 (uma) dose a partir de 60 anos. Para os idosos não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, deve ser administrada mais 1 (uma) dose adicional, uma única vez, respeitando o intervalo mínimo de 5 (cinco) anos da dose inicial. O volume da dose é de 0,5 mL, por via subcutânea.
26. A transmissão do tétano neonatal acontece por contaminação durante a manipulação do cordão umbilical ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical, quando se utilizam substâncias, artefatos ou instrumentos contaminados com esporos.
27. É proibido ao profissional de enfermagem delegar atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado.
28. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
29. A psicoterapia é uma parte fundamental no tratamento da depressão, sendo indicada tanto para os quadros leves, em que os antidepressivos podem não ter uma indicação necessária, como nos quadros graves, junto da farmacoterapia.
30. As medidas profiláticas para oxiriúase incluem hábitos de higiene corporal e limpeza de roupas íntimas, lençóis, toalhas e do próprio ambiente, bem como manter limpas as instalações sanitárias e tratamento adequado dos doentes.
31. O tratamento da emergência hipertensiva consiste em transferência do paciente a uma unidade de tratamento intensivo, administração de anti-hipertensivo oral e monitoramento contínuo e cuidadoso durante terapia visando a prevenção da hipotensão.
32. O rastreamento da hipertensão é recomendado para todo adulto com idade maior ou igual a 18 anos, quando presente na Unidade de Atenção Primária para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros; se não houver registro no prontuário de ao menos uma verificação da pressão arterial (PA) nos últimos dois anos, verificar e registrar a PA.
33. O envelhecimento patológico (senilidade) está relacionado a alterações originadas por enfermidades associadas ao envelhecimento em si, que, portanto, não se confundem com as mudanças normais desse processo.
34. A dieta por via oral é utilizada em pacientes inconscientes e com baixo risco de aspiração, como forma de suplementação alimentar. Para utilizar essa via com segurança, o paciente deve ter o reflexo de deglutição preservado e o esfíncter esofágico inferior competente.
35. As manifestações clínicas mais frequentes da cólera são diarreia e vômitos, com diferentes graus de intensidade. Tal quadro leva rapidamente à desidratação intensa e deve ser tratado precoce e adequadamente, para se evitar a ocorrência de complicações e óbito.
36. Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante o procedimento, elas deverão ser removidas imediatamente e as mãos rigorosamente lavadas, e novamente enluvadas, antes de completar o procedimento.
37. Em relação à contenção mecânica do usuário em crise ou nos casos de urgência e emergência, os profissionais de enfermagem somente poderão conter o indivíduo sob supervisão direta da(o) enfermeira(o), preferencialmente em conformidade com diretrizes estabelecidas pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados.
38. Os dispositivos utilizados para infusão venosa de medicamentos ou fluidos devem ser utilizados rotineiramente como acesso a amostras de sangue.

39. A medula espinhal, assim como todo o sistema nervoso central, é envolvida por três membranas chamadas meninges: a dura-máter; a aracnóide; e a subdural. A dura-máter é a membrana mais externa e espessa, enquanto a subdural é a membrana mais interna e delicada. A aracnóide localiza-se entre a dura-máter e a subdural.
40. Em qualquer ritmo de parada cardiorrespiratória, a primeira droga a ser utilizada deve ser a adrenalina. Recomenda-se administração de adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 minutos.
41. As glândulas do sistema endócrino se diferenciam das chamadas glândulas exócrinas porque o produto da sua secreção – hormônio – atua diretamente sobre o órgão alvo.
42. O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica deve ser baseado em pelo menos duas aferições de pressão arterial por consulta, em pelo menos duas consultas.
43. A transmissão da Filariose Linfática se dá basicamente pela picada do mosquito *Culex quiquefasciatus* infectado com larvas do parasita.
44. Para quantificação do pulso nos bebês e nas crianças com menos de três anos, deve ser utilizado um estetoscópio para auscultar o coração, e não a palpação de uma artéria.
45. A ansiedade passa a ser preocupante e pode se tornar patológica quando surge sem estímulo aparente ou que não seja proporcional aos sentimentos que desperta, em relação à intensidade, duração e frequência.
46. A suscetibilidade ao vírus influenza é geral, e a imunidade é adquirida a partir da infecção natural ou pela vacinação, que garante imunidade para todas as cepas variantes do vírus.
47. Antes de utilizar a cânula orofaríngea, deve-se realizar a aferição do tamanho adequado ao paciente (distância entre o lobo da orelha e a borda lateral da boca). Em crianças, esse dispositivo deve ser posicionado com o lado côncavo para cima no orifício oral do paciente, e, após adentrar, realizar um giro de 180° do equipamento para acomodá-lo sobre a língua.
48. O sangue que sai do coração é rico em oxigênio, sendo transportado aos tecidos pelos vasos sanguíneos chamados veias. O sangue que volta dos tecidos ao coração é rico em gás carbônico, sendo transportado pelos vasos sanguíneos chamados artérias. Tanto as artérias quanto as veias se ramificam em vasos muito finos chamados capilares, constituindo a trama vascular presente nos órgãos e tecidos.
49. A auditoria concorrente ou operacional é a auditoria feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para a avaliação.
50. Recomenda-se que a criança receba o leite materno já na primeira hora de vida, por 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, é recomendada a amamentação exclusiva, ou seja, apenas o consumo do leite materno, sem nenhum outro alimento ou líquidos.
51. São considerados produtos para a saúde semicríticos aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Esses artigos devem, no mínimo, sofrer desinfecção de nível intermediário. A esterilização desses artigos não é obrigatória.
52. A prescrição de antidepressivos irá depender da intensidade e frequência dos episódios depressivos. O risco de suicídio deve ser sempre avaliado e os efeitos colaterais da medicação em relação às condições de sofrimento do paciente.
53. É de notificação compulsória imediata (em até 24 horas) todo caso confirmado como sífilis adquirida ou em gestante, devendo ser notificado à vigilância epidemiológica. A notificação é registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
54. O diafragma precisa ser colocado antes de cada relação sexual e deve ser retirado no mínimo de 6 a 8 horas depois. Para ficar bem conservado e higiênico, o diafragma deve ser lavado após cada uso e guardado bem limpo e seco, podendo assim ser reutilizado.
55. O diagnóstico parasitológico da ascariíase baseia-se na detecção de ovos de *Ascaris lumbricoides* nas fezes do paciente, facilmente encontrados e identificados, por suas características e pela imensa quantidade eliminada nas fezes do hospedeiro.
56. Recomenda-se a oferta de testagem para HIV e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) apenas aos pacientes sexualmente ativos que apresentem sintomas ou queixas, em especial após exposição de risco.
57. Na reanimação cardiopulmonar em paciente adulto e intubado ou com outro dispositivo de via aérea avançada, as compressões torácicas passam a ser ininterruptas, e deve ser ofertada uma ventilação a cada seis segundos.
58. O CAPSad atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.
59. A transmissão da raiva ocorre a partir da penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas.
60. Quando o usuário necessitar de serviços que não estão disponíveis na Unidade Básica de Saúde, deve ser realizada a referência, ou seja, os profissionais da Estratégia Saúde da Família deverão encaminhar os usuários a outros pontos da rede de atenção e fazer a contrarreferência, que é o recebimento das orientações de maneira a permitir a continuidade na atenção e a manutenção do vínculo.
61. As imobilizações de membros devem ser realizadas por pelo menos dois socorristas: um deles realiza a manipulação cautelosa do membro lesionado e o outro imobiliza. Deve-se tentar alinhar o membro por, no máximo, duas vezes. Se houver resistência, dor ou não for possível realizar o alinhamento, deve-se imobilizar o membro da forma como ele se apresenta inicialmente.
62. O ciclo biológico do *Schistosoma mansoni*, parasito causador da esquistossomose, se processa em dois hospedeiros. O homem é o hospedeiro intermediário e os hospedeiros definitivos são os caramujos do gênero *Biomphalaria*.

63. O psicólogo inserido no contexto hospitalar busca medidas terapêuticas baseadas no suporte emocional, apoio psicológico, intervenções clínicas breves e focais que favoreçam reflexões que possibilitem novos padrões adaptativos com ênfase nas dificuldades apresentadas.
64. Adultos e adolescentes vivendo com HIV podem receber todas as vacinas do calendário nacional, desde que não apresentem deficiência imunológica importante.
65. Na rotina dos serviços de saúde, a vacina Poliomielite 1 e 3 atenuada (VOP) é recomendada para crianças até 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas com 5 (cinco) anos de idade ou mais, sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, deverão receber a VOP, excepcionalmente, se forem viajantes residentes no Brasil que estiverem se deslocando para áreas com recomendação da vacina.
66. A ampola constitui-se em um recipiente de plástico e/ou de vidro, utilizado para acondicionar o medicamento líquido ou em pó. É necessário aspirar o conteúdo com seringa e agulha para administrar ao paciente.
67. O segundo período do trabalho de parto é chamado de expulsão. Inicia-se com a completa dilatação do colo uterino e termina com o nascimento do bebê.
68. As áreas irrestritas do centro cirúrgico permitem a circulação de pessoal e de equipamentos, de modo que não interfira no controle e na manutenção da assepsia cirúrgica. Nesses locais, é necessário o uso de uniforme privativo e de propés ou calçados adequados.
69. Nos refrigeradores domésticos, os imunobiológicos devem ser organizados por tipo (viral ou bacteriano) e acondicionados na 1ª prateleira, colocando-se na frente os produtos com prazo de validade mais curto para que sejam utilizados antes dos demais.
70. O atendimento psicológico em uma Unidade de Emergência surge em função de quadros reativos à situação da gravidade do caso, necessidade de atendimento emergencial e as próprias características ansiogênicas de um setor de urgência. É importante que, mediante essa percepção, a(o) psicóloga(o) acolha a pessoa para ajudá-la a se apropriar de seu próprio tratamento.
77. O volume do recipiente, que possui a forma de um tronco de pirâmide de base quadrada com arestas das bases medindo 10 cm e 4 cm, e aresta lateral de  $4\sqrt{3}$  cm, é comprovadamente inferior a 280 centímetros cúbicos.
78. Os servidores públicos têm direito à aposentadoria voluntária após 30 anos de contribuição, se homem; e 25 anos, se mulher.
79. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, tem como objetivo promover a transparência e a responsabilidade no serviço público.
80. Os servidores públicos têm direito à estabilidade no cargo após três anos de efetivo exercício profissional em uma entidade pública.
81. Compete ao diretor de fisioterapia coordenar a equipe de profissionais do CAPS no município de Surubim – PE (Lei Municipal nº 482/2023).
82. O Decreto nº 1.171/1994 trata exclusivamente de questões relacionadas à remuneração dos servidores públicos federais.
83. O Decreto nº 1.171/1994 determina a aplicação de penalidades disciplinares caso haja descumprimento de suas regras.
84. São atribuições da Secretaria de Juventude elaborar e executar programas de atendimento e apoio à toda comunidade do município de Surubim – PE (Art. 116 de Lei Municipal nº 482/2023).
85. Compete ao Coordenador de Transparência monitorar as informações do Portal da Transparência do município de Surubim – PE (Art. 16 da Lei Municipal nº 482/2023).
86. São atribuições da Diretoria de Compras coordenar, controlar e gerir a folha de pagamento dos servidores do município de Surubim – PE (Art. 32 da Lei Municipal nº 482/2023).
87. O art. 39 da Constituição prevê a obrigatoriedade de concurso público para ingresso nos cargos e empregos públicos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.
88. Se a mediana de “n” números distintos é maior que a média, isso significa que há mais termos acima da média do que abaixo dela.
89. A regra de três permite descobrir um valor não identificado, por meio de outros três valores conhecidos. A regra de três composta, por sua vez, permite descobrir um valor desconhecido a partir de três ou mais valores conhecidos.
90. Considere “p” e “q” como números primos e raízes da equação  $x^2 - 99x + k = 0$ , com “k” sendo um número real arbitrário. Nesse caso, a soma  $p/q + q/p$  é maior do que 47.
91. Um investidor está considerando a compra de um terreno por R\$ 20.000,00. Ele tem a certeza de que o terreno valerá R\$ 30.000,00 daqui a 5 anos. Se ele tiver a opção de investir o dinheiro com juros compostos a uma taxa de 9% ao ano em um banco, é correto sugerir que ele compre o terreno, pois isso será mais vantajoso do que o retorno proporcionado pelo banco.
92. Em um clube, a média de idade das 25 crianças é de 4 anos e 3 meses. É necessário que mais de 10 crianças com 4 anos e 9 meses ingressem no clube para elevar essa média para 4 anos e 4 meses.

### QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 71 a 100)

#### Julgue os itens a seguir.

71. Os ditongos abertos “éi” e “ói” são acentuados, de acordo com a regra das palavras paroxítonas.
72. O pronome oblíquo átono “LHE” pode ser utilizado para indicar posse, como em “Cortem-lhe a cabeça”.
73. O sujeito elíptico é um tipo de sujeito oculto que não pode ser identificado na frase.
74. A palavra “encharcado” possui um “ch” porque segue a regra de que os vocábulos iniciados em “EN” precisam ter o CH depois.
75. A palavra “reinvidicar” está grafada corretamente, seguindo as regras de ortografia.
76. As palavras “gás” e “pôr” possuem acento indicativo de vogal aberta.

93. Considere um quadrilátero ABCD, onde  $AB = 10$ ,  $BC = 6$ ,  $CD = 8$  e  $DA = 2$ . As diagonais AC e BD se intersectam em O, e o ângulo COB é de  $45^\circ$ . Podemos concluir que a área do quadrilátero ABCD é, de fato, maior que 30.
94. Um celular está disponível para compra com duas opções: pagamento à vista por R\$ 2.000,00 ou a prazo com uma entrada de R\$ 400,00, seguida por uma parcela de R\$ 1.800,00 que deve ser paga três meses após a compra. Podemos concluir que a taxa de juros compostos mensal para o financiamento é superior a 3,5% ao mês.
95. A é x% maior que B e representa x% da soma de A e B. O valor aproximado de x é 62%.
96. Sejam "m" e "n" raízes da equação  $x^2 - 4x + c = 0$ , com "c" um número real. Se  $-m$  é uma raiz de  $x^2 + 4x - c = 0$ . É correto afirmarmos que  $m \cdot n$  é um valor maior que  $-5$ .
97. Os vocábulos "pátria", "sócio" e "história" são acentuados graficamente pelo mesmo motivo gramatical.
98. O adjetivo "verde" é uma classe gramatical variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere.
99. Em uma oração subordinada substantiva completiva nominal, o verbo da oração principal é sempre transitivo direto.
100. O particípio passado é uma forma verbal utilizada para formar os tempos compostos e a voz passiva.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

**RASCUNHO**