



CONCURSO PÚBLICO EDITAL  
Nº 01.01/2023  
MUNICÍPIO DE CURIÚVA  
ESTADO DO PARANÁ

1. “Seu pedido já está pronto, senhora”.

**Sobre a vírgula que separa o termo senhora é correto afirmar que:**

- a) A vírgula foi empregada corretamente, pois separa, na oração, o vocativo.
- b) A vírgula foi mal empregada, pois separa o sujeito da oração do verbo.
- c) A vírgula foi bem empregada, pois, nesse caso, seu uso é facultativo.
- d) A vírgula foi mal empregada, pois não se separa o aposto do termo a que se refere.

2- **Leia o texto e responda às questões.**

**A origem do nome**

...Sabe de onde vem a palavra Amazônia? De Amazonas, nome dado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana ao rio que ele percorreu em 1541. À época, Orellana viajou pelo rio e afirmou ter combatido um grupo formado só por índias. Não se sabe se isso ocorreu realmente, mas o fato é que o espanhol, ao contar essa história, comparou as indígenas às amazonas, mulheres guerreiras que, diz a lenda, viviam as margens do Mar Negro, localizado entre Europa e Ásia. Depois do rio, o nome Amazonas batizou a região e, a seguir, o estado que se formou. Ao receber a terminação “ia”, formou a palavra que dá nome à floresta: Amazônia. -

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 179.

Disponível em: <<http://capes.cienciahoje.org.br>>.

“[...] viviam as margens do Mar Negro [...]”, com relação à expressão em destaque indique a alternativa correta:

- a) A expressão está correta segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
- b) A expressão está correta, mas deveria estar entre vírgulas.
- c) A expressão está incorreta, pois o verbo deveria estar no singular.
- d) A expressão está incorreta, pois exige-se o acento indicativo de crase “às margens”.

3- **Leia o trecho:**

“Não se sabe se isso ocorreu realmente, mas o fato é que o espanhol, ao contar essa história, comparou as indígenas às amazonas, mulheres guerreiras que, diz a lenda, viviam as margens do Mar Negro, localizado entre Europa e Ásia.”

**A conjunção em destaque estabelece a relação de:**

- a) Oposição.
- b) Alternativa.
- c) Conclusão.
- d) Explicação.

4- **Assinale a alternativa incorreta em relação à regência verbal, segundo a norma culta da Língua Portuguesa:**

- a) A ausência da mãe custou ao filho.
- b) A sua desconfiança procede de situações anteriormente vivenciadas.
- c) Após muitos investimentos, visamos o sucesso.
- d) Aspirou ao cargo de diretor.

5. **Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal/nominal, de acordo com a norma culta:**

- a) Fazem muitos anos que meus pais não vem aqui.
- b) Choveram pedaços de granizo ontem à noite.
- c) Haviam muitos candidatos inscritos, mas poucos compareceram.
- d) Seus apartes eram sempre o mais interessantes possíveis.

6. **Ao resolver a inequação  $\frac{x-3}{x^2-8x+15} \leq 0$ , tenho como resposta:**

- a)  $x \in R / x \leq 5$  e  $x \neq 3$
- b)  $x \in R / x < 5$
- c)  $x \in R / x \neq 3$
- d)  $x \in R / x < 5$  e  $x \neq 3$

7. Qual a taxa mensal de um capital aplicado por dois anos, para render juros equivalente ao dobro do capital ? (considere:  $\sqrt[24]{2} = 1,03$ ;  $\sqrt[2]{2} = 1,41$ )

- a) 3% a.m.
- b) 4% a.m.
- c) 5% a.m.
- d) 6% a.m.

8. Ao resolver o sistema  $\begin{cases} y + 3z = 1 \\ 1x + 2y + 4z = 0 \\ 2x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$ , classificamos como:

- a) Sistema Possível Determinado.
- b) Sistema Possível Indeterminado.
- c) Sistema Impossível.
- d) Sistema de equação do 3º grau.

9. Considere as afirmações:

I-  $C_{n,p} = C_{n,n-p}$

II-  $A_{n,p} = A_{n,n-p}$

III-  $C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!}$

Assinale a alternativa correta abaixo:

- a) Somente a I está correta.
- b) Somente a I e II estão corretas.
- c) Somente a I e III estão corretas.
- d) Somente a II e III estão corretas.

10. A figura que tem quatro lados iguais é chamado:

I- Todo quadrado é um caso especial de retângulo.

II- Todo retângulo é um caso especial de quadrado.

III- Toda figura que tem quatro lados iguais sempre é chamada quadrado

- a) Somente a I está correta.
- b) Somente a I e II estão corretas.
- c) Somente a I e III estão corretas.
- d) Somente a II e III estão corretas.

11. Qual função do MS-Excel é responsável por retornar verdadeiro se todos os seus argumentos forem verdadeiros?

- a) Função SE.
- b) Função FALSO.
- c) Função LET.
- d) Função E.

12. Assinale a alternativa que corresponda ao nome do componente de computador representado abaixo



- a) Cooler.
- b) Processador.
- c) Placa de vídeo.
- d) Gabinete.

- 13. Das alternativas abaixo, qual corresponde a um exemplo de navegador de internet?**
- Yahoo!.
  - Ask.
  - Bing.
  - Mozilla Firefox.
- 14. O atalho Ctrl + 9, quando utilizado no Google Chrome é responsável por:**
- Ir para a última guia à direita.
  - Abrir a próxima página do histórico de navegação na página atual.
  - Fechar janela atual.
  - Acessar uma guia específica.
- 15. São exemplos de compactadores de arquivos, EXCETO:**
- Winrar.
  - Winzip.
  - Encode.
  - ARJ.
- 16. Em relação à mortalidade prematura por obesidade, foram registrados no SIM 24.678 óbitos de indivíduos com idade entre 30 e 69 anos durante o período de 2010 a 2021. A distribuição do total de óbitos por ano também apresentou aumento acentuado, sendo maior o número de registros no período entre 2019 e 2021.**
- No contexto das discussões acerca da obesidade, assinale (V) para as alternativas Verdadeiras e (F) para as Falsas:**
- Ao analisar a mortalidade proporcional prematura segundo as variáveis sexo e faixa etária, observa-se maior registro entre as idades entre 50 e 69 anos (60%) e do sexo feminino (57%).
  - A obesidade não tem relação com o ambiente em que a pessoa se vive, considerando o cuidado individual como o suficiente para reduzir a incidência de obesidade na sociedade.
  - O chamado ambiente obesogênico pode estar presente em residências, nas vizinhanças, nas escolas, nas universidades e nos locais de trabalho.
  - Considerando a temática da obesidade, são recomendadas políticas públicas de saúde, com ações que priorizem: tributação de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados; ampliação no acesso a alimentos saudáveis, dentre outras...
- Assinale a alternativa correta:**
- F;F;V;V.
  - V;F;V;F.
  - V;F;V;V.
  - F;F;F;V.
- 17. Os Determinantes Sociais da Saúde são as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem.**
- Diante a afirmativa acima assinale a alternativa correta:**
- Posições sociais que colocam o indivíduo em desvantagem e em situação de vulnerabilidade podem ser acirradas pela existência de racismo estrutural, preconceito relacionado a gênero, à deficiência e à origem; pela não distribuição adequada de renda e por políticas governamentais superficiais ou baseada em méritos pessoais, ao ignorar que a desigualdade está na base das relações.
  - A orientação a partir do modelo conceitual dos Determinantes Sociais da Saúde nos determinantes estruturais não é considerada fundamental para provocar mudanças significativas na sociedade, não sendo necessário intervir nesses determinantes.
  - Em relação aos elementos apresentados na literatura que estão ligados ao "fazer" em relação à prática de atividade física, não há necessidade de considerar: anos de estudo, renda, tempo livre, cor, gênero, segurança das cidades, distância de locais de práticas e apoio social.
  - A desigualdade social não é sustentada por estruturas formais ou informais, como a educação, o mercado ou a seguridade social.

18. São vários os entendimentos que resumem a promoção da saúde à prevenção de doenças ou alçam esta última ao patamar da primeira. Considerando um exercício de comparação entre promoção da saúde e prevenção de doenças a fim de contribuir para esse entendimento, pode-se considerar definições em relação a algumas características que auxiliam no delineamento do Marco conceitual; significado do termo; Objetivos e Foco.

Neste sentido, em relação à **PROMOÇÃO DA SAÚDE**, correlacione as colunas a seguir:

Coluna A

- a. Marco Conceitual.
- b. Significado do termo.
- c. Objetivos.
- d. Foco.

Coluna B

- I- Mudanças nos determinantes estruturais que provocam iniquidades em saúde.
- II- Determinantes Sociais da Saúde.
- III- Promover o bem-estar geral por meio da transformação das condições de saúde.
- IV- Impulsionar; fomentar; originar; gerar; mudar.

Assinale a alternativa correta:

- a) a-II; b-IV; c-III; d-I.
- b) a-IV; b-I; c-II; d-III.
- c) a-III; b-II; c-I; d-IVII.
- d) a-II; b-IV; c-I; d-III.

19. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento e acompanhamento dos pacientes em unidades básicas de saúde e em referência, não sendo necessário internação.

Diante o exposto, assinale a alternativa correta:

- a) A duração do tratamento varia de acordo com a forma clínica da doença. Para pacientes com hanseníase paucibacilar (PB) a duração é de 12 meses e para pacientes com hanseníase multibacilar (MB) a duração é de 24 meses.
- b) Durante as consultas mensais o paciente recebe uma nova cartela de PQT-U e sendo assistido por um profissional de saúde, faz uso da dose supervisionada. As demais doses da cartela de PQT-U são tomadas em seu domicílio.
- c) O aleitamento materno deve ser proibido durante o uso de Poliquimioterapia Única (PQT-U).
- d) Pessoas com peso inferior a 50 Kg devem ter as doses de medicamentos ajustadas para sua condição.

20. A tuberculose (TB) ainda é considerada um problema global de saúde pública. Em 2020, estimou-se um total de 9,9 milhões de pessoas acometidas pela doença no mundo, o que significa uma incidência de 127 casos por 100 mil habitantes.

Diante esse problema de saúde pública, assinale (F) para as alternativas Falsas e (V) para as alternativas Verdadeiras:

- I- ( ) Ampliação da prática clínica do enfermeiro ainda são restritas no cotidiano do cuidado às pessoas com Tuberculose, sendo atribuído somente ao médico as ações que promovem a identificação precoce da TB ativa e da ILTB, além do manejo clínico dos casos identificados e das fundamentais ações relacionadas à prevenção, ao monitoramento dos casos e ao TDO de qualidade.
- II- ( ) A Tuberculose aumenta a exclusão social e a exclusão social aumenta a TB; assim, é importante considerar a saúde como um processo social. A forma como vivemos e as nossas condições de trabalho promovem maneiras distintas de pensar, agir e sentir a saúde e a doença.
- III- ( ) No cenário brasileiro, considerando os grandes investimentos para disponibilização de insumos para o cuidado das pessoas com tuberculose, pode-se afirmar que a adesão ao tratamento não é mais considerada como desafio para o controle da TB.

IV- ( ) No cotidiano da assistência à saúde, algumas pessoas, apesar de manifestarem a intenção da adesão, podem se deparar com a complexidade da terapêutica e interromper o tratamento.

Assinale a alternativa correta:

- a) V;V;F;F.
- b) F;V;F;V.
- c) Todas as alternativas são verdadeiras.
- d) Todas as alternativas são falsas.

21. A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. É uma doença febril que tem se mostrado de grande importância em saúde pública nos últimos anos.

Considerando a importância de ações de prevenção no contexto da Dengue, assinale a alternativa correta:

- a) O vírus dengue (DENV) é uma zoonose transmitido pela picada do macho do mosquito *Aedes aegypti* e possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).
- b) A infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), apresentar quadro leve, sinais de alarme e de gravidade.
- c) Nos casos graves o choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido pelo extravasamento. Ocorre habitualmente entre o 8º e o 10º dia – no intervalo de 7 a 13 dias de doença.
- d) Atualmente as vacinas contra a dengue são as principais ações de prevenção da doença.

22. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

Diante o exposto assinale a alternativa correta:

- a) A febre amarela não é considerada uma doença de notificação compulsória imediata, sendo necessário a notificação quando apresenta ciclo de transmissão urbana.
- b) Os vetores silvestres têm hábito noturno, realizando sua alimentação com sangue durante as horas mais frescas, sendo os vetores dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.
- c) O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado.
- d) No ciclo urbano, o homem, os cães e gatos são os únicos hospedeiros com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.

23. A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) é indicada para prevenir as formas graves de Tuberculose (Miliar e Meníngea). O esquema de vacinação é em dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.

Assinale a alternativa correta:

- a) Em crianças nascidas com peso inferior a 1.750 Kg, adiar a vacinação até que atinjam o peso de 2.500 kg.
- b) As crianças vacinadas na faixa etária correta que não apresentam cicatriz vacinal precisam ser revacinadas novamente com duas doses.
- c) Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação pode ser realizada desde que seja administrada duas doses.
- d) Na rotina, a vacina é destinada a crianças na faixa etária de 0 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

24. Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.

Considerando as orientações acerca da vacinação da poliomielite, assinale (F) para as alternativas Falsas e (V) para as alternativas Verdadeiras:

- I-  Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de duas doses da vacina injetável – VIP (1 e 2 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente– VOP (gotinha).
- II-  Os sinais e sintomas da poliomielite variam conforme as formas clínicas, desde ausência de sintomas até manifestações neurológicas mais graves. A poliomielite pode causar paralisia e até mesmo a morte, mas a maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas, deixando a doença passar despercebida.
- III-  A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus, causador da poliomielite.
- IV-  No processo de diagnóstico os exames de liquor (cultura) e a eletromiografia são recursos diagnósticos importantes. O diagnóstico será dado pela detecção de poliovírus nas fezes.

Assinale a alternativa correta:

- a) F;V;V;V.  
b) V;V;V;F.  
c) V;F;F;V.  
d) F;F;F;V.

25. O Cuida Mais Brasil tem o propósito de aprimorar as ações estratégicas assistenciais de integração da Atenção Primária à Saúde (APS) na Rede de Atenção à Saúde (RAS), com foco na saúde da mulher e na saúde materna e infantil. Neste sentido, considerando a importância de ações de prevenção da transmissão vertical do HIV/Aids, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, assinale (F) para as alternativas Falsas e (V) para as alternativas Verdadeiras:

- I-  Em mulheres com CV(Carga Viral) desconhecida ou maior que 1.000 cópias/mL após 34 semanas de gestação, a cesárea eletiva a partir da 38ª semana de gestação diminui o risco de TV do HIV.
- II-  Iniciar a primeira dose de AZT solução oral (preferencialmente ainda na sala de parto), logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 4 horas após o nascimento.
- III-  Para gestantes que tenham comprovadamente HBsAg reagente e que iniciem tardiamente o pré-natal, ou que não tenham acesso ao resultado da CV-HBV em tempo hábil, será necessário considerar iniciar profilaxia com TDF enquanto se aguarda CV-HBV ou até o momento do parto.
- IV-  A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento de sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação. Recomenda-se tratamento imediato, com Benzilpenicilina benzatina, após apenas um teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico) para as seguintes situações (independentemente da presença de sinais e sintomas de sífilis).

Assinale a alternativa correta:

- a) F;V;F.  
b) F;F;F;V.  
c) V;F;F;V.  
d) Todas as alternativas são verdadeiras.

26. A Política Nacional de Saúde Mental compreende estratégias e diretrizes adotadas pelo país para organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Abrange a atenção à pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo etc. Considerando o contexto da Saúde Mental e Psiquiátrica, assinale a alternativa correta:

- a) O uso, abuso e dependência química são problemas complexos, multifatoriais, que exigem abordagem interdisciplinar, envolvendo múltiplas áreas governamentais.
- b) A adesão ao tratamento é fundamental, uma vez interrompido por conta próprio ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de cronicização. O tratamento deve ser realizado somente em ambulatórios especializados visto a dificuldade de suporte assistencial nos diferentes serviços da Rede de Atenção à Saúde.



- c) Em relação aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o CAPS I, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas.
- d) CAPS III atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes.

**27. A Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma estrutura física e técnico-administrativa, orientada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização (CGPNI) do Ministério da Saúde, que permeia as três esferas de governo (União, Estados e Municípios). O processo logístico dessa Rede, a Cadeia de Frio, envolve o sistema de armazenamento, transporte e manuseio em condições adequadas de temperatura dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o momento de aplicação no usuário.**

**Considerando o contexto da Rede de Frio do PNI, assinale a alternativa correta:**

- a) As vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando expostas à temperatura abaixo de  $-2^{\circ}\text{C}$ , podem ter perda de potência em caráter permanente.
- b) A Sala de imunização (SI) representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável exclusivamente pelos procedimentos de vacinação de rotina. As SIs que estão estruturadas em estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade poderão realizar aplicação de imunoglobulina.
- c) Em relação à vacina Pentavalente, considerando a importância de manter as vacinas preservadas em ambientes devidamente resfriados, deve dispor de circulação de ar forçado para garantia da distribuição uniforme de temperatura no interior da câmara e controle microprocessado de temperatura na faixa de trabalho  $1^{\circ}$  à  $10^{\circ}\text{C}$ .
- d) A alteração da temperatura de conservação, diante o desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento das vacinas, não pode comprometer a potência imunogênica da vacina.

**28. Na legislação brasileira considera-se idosa aquela pessoa que atingiu 60 anos ou mais de idade. O perfil de saúde da população idosa é caracterizado por três tipos principais de problemas: doenças crônicas, problemas de saúde agudos decorrentes de causas externas e agravamento de condições crônicas. Isso significa que muitos idosos lidam com doenças duradouras e enfrentam riscos de morte e doenças súbitas causadas por acidentes ou problemas agudos.**

**Considerando o cuidado da pessoa idosa, assinale a alternativa correta:**

- a) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos.
- b) Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve prever intervenções no campo clínico, psicossocial e funcional que permitam preservar ou recuperar a autonomia e a independência, bem como identificar eventos que possam indicar riscos de piora nas condições gerais dos indivíduos, devendo ser construído e gerido pelo serviço especializado, mesmo que não apresente comprometimentos graves, visto a necessidade de cuidados de maior densidade tecnológica.
- c) Para a organização e o planejamento da atenção à saúde da pessoa idosa, considerando a imensa diversidade de condições e de capacidades funcionais dos indivíduos, é necessária a realização da avaliação do especialista geriatra, sendo em muitos casos a necessidade de internação compulsória para garantir cuidados que atendam as necessidades da pessoa idosa.
- d) As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) está indicado para os idosos que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

**29. A Prevenção Combinada é uma estratégia que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção (biomédica, comportamental e estrutural) aplicadas em múltiplos níveis (individual, nas parcerias/relacionamentos, comunitário, social) para responder a necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV.**

**No contexto da prevenção da infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta:**

- a) As intervenções comportamentais são ações voltadas à redução do risco de exposição, mediante intervenção na interação entre o HIV e a pessoa passível de infecção.
- b) A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais, neste sentido, as populações prioritárias do HIV, são: Gays e outros HSH; Pessoas trans; Pessoas que usam álcool e outras drogas; pessoas privadas de liberdade e Trabalhadoras do sexo.
- c) Em relação as populações-chave o Ministério da Saúde as definem sendo: população de adolescentes e jovens; população negra; população indígena e população em situação de rua.
- d) As intervenções estruturais são ações voltadas aos fatores e condições socioculturais que influenciam diretamente a vulnerabilidade de indivíduos ou grupos sociais específicos ao HIV, envolvendo preconceito, estigma, discriminação ou qualquer outra forma de alienação dos direitos e garantias fundamentais à dignidade humana.

**30. A Gonorreia e Clamídias são causadas por bactérias (*Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*) respectivamente. Na maioria das vezes estão associadas, causando a infecção que atinge os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Os sintomas causados por essas bactérias também podem ser provocados por outras bactérias menos frequentes, como Ureaplasmas e Mycoplasmas.**

**Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta:**

- a) Deve-se considerar a possibilidade de acontecer transmissão Gonorreia e Clamídias no parto vaginal e a criança pode nascer com conjuntivite, que pode levar à cegueira se não for prevenida ou tratada adequadamente.
- b) Essas infecções não são assintomáticas, apresentando de forma intensa corrimento vaginal com dor no baixo ventre na mulher, e nos homens, corrimento no pênis e dor ao urinar.
- c) A coloração de Gram não é indicada para os casos da gonorreia, a orientação do Ministério da Saúde é a cultura de amostras de corrimento uretral em meio seletivo de Thayer-Martin, considerado padrão ouro para o diagnóstico, sendo o que está disponível e registrado pela Anvisa.
- d) As diretrizes do Ministério da Saúde indicam o rastreamento anual por meio de swab anal para detecção de clamídia e gonococo por biologia molecular para todas as pessoas com prática anal receptiva e insertiva sem proteção de barreira.